

# Renouée des oiseaux

*Polygonum aviculare* (latin)



## Description

Dicotylédone annuelle de la famille des polygonaceae. Très souvent étalée, la hauteur peut aller jusqu'à 60 cm. Fleurs blanchâtres ou roses.

Plante médicinale, elle est utilisée contre diarrhée, goutte, hémorroïdes et rhumatismes, elle est astringente, apaisant cutané, vermifuge et diurétique. Elle est toxique si elle est consommée par les animaux en grande quantité.

La période de floraison court de mai à novembre et la période de maturation de juillet à novembre. La levée est échelonnée et la quantité de graines par plante varie entre 500 à 1000 graines par pied. TAD de 50%

## Nuisibilité ●●○○○

La renouée des oiseaux a une nuisibilité moyenne et peut avoir un effet couvre-sol propice à la non levée d'autres espèces. Toutefois en cas de forte infestation, la renouée peut gêner la récolte en s'enroulant comme un liseron vivace

## Vitesse d'implantation ●●○○○

## Quels sont les moyens de lutte?

Rotation des cultures

Peu efficace

Déchaulage et faux semis

Efficace, surtout début printemps

Labour

Peu efficace, sauf au stade plantule

Lutte chimique

Efficace

Décalage date de semis

Pas efficace



Porter une attention particulière à l'entretien régulier des abords de parcelles et le nettoyage du matériel permet de réduire sa prolifération.

Du fait de sa taille et de son comportement «rampant», favoriser les cultures hautes.